

洗眼液 アイボン d

使用注意事项

咨询事项

- 下列人群请在使用前向医师、药剂师或注册经销商咨询
 - 正在接受医生治疗的人
 - 有药物过敏史的人
 - 有下列症状的人：眼睛剧烈疼痛
 - 被诊断为眼球干燥综合征（干眼症**）的人
**以医生诊断出病名的人为前提
- 使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持包装盒向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、发痒
眼睛	充血、发痒、肿胀

功能、效果

清洗眼睛，预防眼部疾病（游完泳后，灰尘或汗水进入眼睛等情况）

用法、用量

请每天3~6次，每次使用5mL进行洗眼

<用法与用量的注意事项>

- 幼儿使用时，请在成人的监护下使用
- 请勿在佩戴隐形眼镜的情况下使用
另外，再次佩戴时，应在洗眼后间隔10~15分钟左右
- 洗眼杯请在使用前后用自来水充分清洗干净
- 若药液浑浊，请勿使用
- 请仅限洗眼使用

成分、含量

100mL 中

成分	含量	作用
ε-氨基己酸	200mg	抗炎作用
尿囊素	30mg	角膜修复作用
甘草酸二钾	10mg	抗炎作用
马来酸氯苯那敏	3mg	抗组胺作用
盐酸吡哆醇(维生素B ₆)	10mg	代谢促进作用
生育酚乙酸酯	5mg	血液循环促进作用
硫酸软骨素钠	50mg	角膜保护作用

添加剂：硼酸、硼砂、聚山梨醇酯80、依地酸钠、1-薄荷醇、d-冰片、pH调节剂

保管及使用注意事项

- (1) 请拧紧瓶盖后装入盒中，保管在避免阳光直射的阴凉地方
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 洗眼杯请勿与他人共用

使用方法

- 佩戴有隐形眼镜的，请在使用前务必取下隐形眼镜
- 请在使用前将眼睛周围的化妆品和污物擦拭干净
- 洗眼杯请在使用前后用自来水充分清洗干净
- 由于保存状态的影响，有时会在瓶口周围附着白色的结晶。出现这种情况时请用洁净纱布轻轻擦拭干净
- 不使用隐形眼镜的人也可以使用

销售商 小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页 <http://www.kobayashi.co.jp>