

外皮用药 **アットノン EX**

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或引起不良反应)

1. 下列人群不要使用

- (1) 患有出血性血液疾病(血友病、血小板减少症、紫斑病等)的人
- (2) 即使极少量的出血也预测可能会引起严重后果的人(具有抑制血液凝固的作用, 有可能促进出血)

2. 下列以下部位不能使用 眼和眼的周围、粘膜(例如, 口腔、鼻腔、阴道等)

咨询事项

1. 下列人群请在使用前向医师、药剂师或注册经销商咨询

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 有药物过敏史的人
- (3) 润湿和溃烂比较严重的人

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、发痒、肿胀

3. 使用 5~6 天后, 症状仍无好转, 请停止使用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

伤口、烧伤的痕迹的皮肤的疙瘩、疤痕皱缩(面部除外)、手肘、膝盖、脚后跟、脚踝的角化症、手指的皸裂、手脚的开裂与龟裂、干皮病、幼儿的干性皮肤、冻伤(溃烂除外)、擦伤与扭伤后的肿胀、肌肉痛、关节痛

用法、用量

请每天 1~数次, 适量涂于患部或涂抹在纱布等上后粘贴

<用法与用量的注意事项>

- (1) 请每次使用后, 拧紧瓶盖
- (2) 幼儿使用时, 请在成人的监护下使用
- (3) 请注意不要溅入眼睛。万一溅入眼睛时, 请立即用水或者温水清洗。此外, 如果症状较重, 请接受眼科医生的诊断
- (4) 本品仅供外用

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
类肝素	0.3g	促进皮肤新陈代谢作用、血液循环促进作用、水分保持作用
尿囊素	0.2g	辅助受损肌肤的修复
甘草酸二钾	1g	抑制皮肤炎症

添加剂：羟丙甲纤维素、聚丙烯酸、丙二醇、异丙醇、三异丙醇胺、香料

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射，低湿度，阴凉的地方
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>