

使用注意事项

咨询事项

1. 下列人群请在服用前向医师、药剂师或注册经销商咨询

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 妊娠或有妊娠可能的妇女
- (3) 胃肠虚弱的人
- (4) 曾因药物等引起过皮疹、发红、发痒等症状的人

2. 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒

本品偶尔会引发以下严重症状
此时请立即接受医生的治疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	在上楼梯，或稍微过度运动时便会气喘、呼吸困难，并可观察到干咳、发热等现象，突然出现上述症状或持续不止
肝功能障碍	出现发热、发痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、尿液呈褐色、浑身无力、食欲不振等现象

3. 服用约一个月后症状仍无好转，请停止服用，并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

体力中等程度，咳嗽不止，痰多且难以咳尽的以下症状：咳嗽时带有大量的痰、支气管炎

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或热水送服。

年龄	单次剂量	每天服用次数
成人(15岁以上)	1包	3次
未满15岁	× 不可服用	

<用法与用量的注意事项>

请严格遵守规定的用法与用量

- 餐间意味着“两餐之间”，指饭后约2~3小时

成分、含量

每天剂量(3包: 6.0g)中 含清肺汤提取物 3.2g

〈原生中草药换算量〉

黄芩	1.0g	桔梗	1.0g	桑白皮	1.0g
杏仁	1.0g	山梔子	1.0g	天门冬	1.0g
川贝	1.0g	陈皮	1.0g	大枣	1.0g
竹筴	1.0g	茯苓	1.5g	当归	1.5g
麦门冬	1.5g	五味子	0.25g	生姜	0.25g
甘草	0.5g	(添加剂: 含糊精)			

添加剂: 硬脂酸镁, 硅酸酐, 1-薄荷醇, 丙二醇, 乳糖

●由于本剂采用了天然产物(草药), 因此颗粒的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉地方
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中(可能造成误用或者变质)

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>