

外用消炎镇痛剂 ニューアンメルツヨコヨコA

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或引起不良反应)

1. 请勿对以下部位使用

(1) 眼部周围、粘膜等部位

(2) 湿疹、皮疹、伤口

咨询事项

1. 下列人群请在使用前向医师、药剂师或注册经销商咨询

有药物过敏史的人。

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒、发胀、疼痛、发热、刺痛感

3. 使用5~6天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

颈强直、肌肉痛、肌肉疲劳、腰痛、跌打伤、扭伤、关节疼痛

用法、用量

1 日数次, 适量涂于患部

<用法与用量的注意事项>

(1) 幼儿使用时, 请在成人的监护下使用

(2) 请注意不要溅入眼睛。万一溅入眼睛时, 请立即用水或温水清洗。此外, 症状较严重时, 请接受眼科医生的诊疗。

(3) 本品仅供外用。

● 请不要用保鲜膜等透气性较差的物品覆盖涂布部位

● 敏感皮肤的人请不要连续涂布于同一部位

● 在运动和洗澡等流汗的前后使用时, 可能会有较强刺激感、疼痛以及灼热感。上述症状较严重时, 请用肥皂冲洗缓解

## 成分、含量

100mL 中含

乙二醇水杨酸酯 2500mg

1-薄荷醇 3000mg

马来酸氯苯那敏 100mg

烟酸苄酯 10mg

壬酸香蓝酰胺 12mg

添加剂：丙二醇、乙醇、八乙酰蔗糖

## 保管及使用注意事项

(1) 请在密闭瓶盖后保管在避免阳光直射的阴凉地方（冷暗处）

(2) 请将本品放在儿童不能接触的地方

(3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

(4) 请不要靠近火源

（本品为含乙醇物质）

● 请拧紧瓶盖，以防液体渗漏

● 本液体会损伤/污染塑料制品（眼镜框、梳子、马桶等）、化纤类衣物、木材（油漆油漆家私、床等）、皮革等制品，敬请留意

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>