

咽喉用杀菌消毒剂 のどぬーるスプレーB

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或引起不良反应)

1. 下列人员禁用
 - (1) 对本品或本品成分、碘（聚维酮碘）有过敏史的人
 - (2) 患有甲状腺疾病的人
 - (3) 未满2岁的婴幼儿
 - (4) 妊娠或有妊娠可能的妇女
 - (5) 处于哺乳期的妇女
2. 请不要长期连续使用
3. 请不要大量喷射

咨询事项

1. 下列人群请在使用前向医师、药剂师或注册经销商咨询
 - (1) 正在接受医生或牙科医生治疗的人
 - (2) 有药物过敏史的人
 - (3) 有以下症状的人: 口腔严重糜烂
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒
口部	皴裂、刺痛、烧灼感、刺激感
消化器官	恶心
其他	不适感

本品偶尔会引发以下严重症状
此时请立即接受医生的治疗

症状的名称	症状
类过敏症状	使用后即刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、喷嚏、咽痒、呼吸困难等现象

3. 服用5~6天后症状仍无好转, 请停止服用, 并持说明书向医生、牙科医生、药剂师咨询

功能、效果

咽喉的杀菌与消毒

用法、用量

请每天数次，适量喷于患处

<用法与用量的注意事项>

- (1) 请将喷嘴对准咽喉患处，一边轻轻呼气一边喷射。（若在吸气的同时使用，可能导致液体进入支气管和肺部）
- (2) 幼儿使用时需特别注意，请在成人的监护下使用。
- (3) 请注意不要溅入眼睛。万一溅入眼睛时，请立即用水或温水清洗。此外，症状较严重时，请接受眼科医生的诊疗。
- (4) 请仅对咽喉使用。
- (5) 因错误操作饮入大量药液时，请立即接受医生的治疗。

成分、含量

100mL 中

成分	含量	作用
碘	0.5g	咽喉的杀菌和消毒

添加剂：碘化钾，甘油，丙二醇，D-山梨糖醇，乙醇，1-薄荷醇，香料

<成分和含量相关注意事项>

使用本剂后，可能使含牙科银合金材料(假牙等)变色。

使用方法请参阅携带袋

保管及使用注意事项

- (1) 请在密闭瓶盖后保管在避免阳光直射的阴凉地方。
 - (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方。
 - (3) 请勿换装到其他容器中。（可能造成误用或者变质）
 - 使用后，请务必将喷嘴返回原始位置，并盖好盖子进行保管。
 - 携带出门时，请将其装入附带的塑料袋中。
 - 使用过程中，药液喷溅会使衣物变色，请立即用水清洗。
 - 液体无法喷出时，请反复按下泵头，直至液体喷出为止。
 - 保管场所温度较低时，可能导致液体难以喷出。此时请用手心等部位使其升温后再进行使用。
- <其他注意事项>
- 喷射时，请慢慢的按下泵的头部。按下速度过快可能导致液体飞溅，请注意。
 - 用针等物品戳喷嘴的尖端可能导致其折断，十分危险，请绝不要这么做。

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>