

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守,可能会导致目前的症状恶化,或容易产生副作用)

1. 正在服用本药剂期间,请勿服用以下药品
其他腹泻剂(泻药)
2. 哺乳期妇女请勿服用本药剂,或者服用本药剂时要停止哺乳

咨询事項

1. 下列人群请在服用前向医师、药剂师或注册经销商咨询
 - (1) 正在恶心接受医生治疗的人
 - (2) 妊娠或有妊娠可能的妇女
 - (3) 身体虚弱的人(体力衰退的人、身体较弱的人)
 - (4) 胃肠虚弱易腹泻的人
 - (5) 容易出汗的人
 - (6) 老年人
 - (7) 曾因药物等引起过皮疹、发红、发痒等症状的人
 - (8) 有以下症状的人: 浮肿、排尿困难
 - (9) 诊断患有以下疾病的患者: 高血压、心脏病、肾脏病、甲状腺功能障碍
2. 服用后如出现下列症状,可能是引起的不良反应,请立即停止服用,并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

| 相关部位 | 症状 |
|--------|---------------------------------|
| 皮肤 | 皮疹和发红、发痒 |
| 消化器官 | 恶心或呕吐、食欲不振、胃部不适、腹胀、伴随剧烈腹痛的腹泻、腹痛 |
| 精神神经系统 | 晕眩 |
| 其他 | 出汗、心悸、浮肿、头痛 |

本产品偶尔会引发下列严重症状。此时请立即接受医生的治疗

| 症状的名称 | 症状 |
|---------------|--|
| 间质性肺炎 | 上楼梯,或稍微过度运动时便会气喘、呼吸困难,到干咳、发热等症,上述症状突然出现或持续不止 |
| 假性醛固酮增多症、肌肉病变 | 除手脚酸软、麻痹、紧绷、僵硬之外,还会出现无力感、肌肉疼痛,且症状慢慢加重 |
| 肝功能障碍 | 出现发热、发痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、尿液呈褐色、浑身无力、食欲不振等症 |

3. 服用后可能会出现以下症状,若该症状持续不止或增强加重时,请停止服用,并持本说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询: 腹泻、便秘
4. 若服用一个月左右后(因便秘而服用时为1周左右)症状仍无好转,请停止服用,并持本说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询
5. 长期连续服用时,请向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

体力充沛，腹部皮下脂肪较多、有便秘倾向的以下症状：肥胖症，伴随高血压和肥胖的心悸、肩膀酸痛、头部胀红、浮肿、便秘，蓄脓症（鼻窦炎），湿疹、皮炎，疙瘩（粉刺）

用法、用量

请按照以下剂量，餐前或餐间用水或温水服用

| 年龄 | 单次剂量 | 每日服用次数 |
|-----------|------|--------|
| 成人(15岁以上) | 5片 | 3次 |
| 未满15岁 | × | 不可服用 |

<用法与用量的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 本剂易受潮，因此每次服用后请妥善盖紧瓶盖
- 餐间是指“两餐之间”指餐后约2~3小时

成分、含量

每日用量(15片)中

含防风通圣散料干燥提取物 5.0g

<以下中草药提取>

| | | | |
|----|------|--------|------|
| 当归 | 1.2g | 芍药 | 1.2g |
| 川芎 | 1.2g | 山栀子 | 1.2g |
| 连翘 | 1.2g | 薄荷 | 1.2g |
| 生姜 | 0.3g | 荆芥 | 1.2g |
| 防风 | 1.2g | 麻黄 | 1.2g |
| 大黄 | 1.5g | 硫酸钠+水盐 | 1.5g |
| 白朮 | 2.0g | 桔梗 | 2.0g |
| 黄芩 | 2.0g | 甘草 | 2.0g |
| 石膏 | 2.0g | 滑石 | 3.0g |

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、硬脂酸镁、玉米淀粉

●由于本剂采用了天然物（中草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

保管与使用注意事项

- (1) 请盖紧瓶盖，并在避光阴凉处保管
- (2) 请将本品放在儿童不易接触的地方
- (3) 请勿倒入其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用沾水的手拿取本药剂
- (5) 瓶中的充填物用于防止药剂在运送时受损，开封时请丢弃

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>