

外皮用药 **さいき a**

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或引起不良反应)

下列人群不要使用

- (1) 患有出血性血液疾病(血友病、血小板减少症、紫斑病等)的人
- (2) 即使极少量的出血也预测可能会引起严重后果的人(具有抑制血液凝固的作用, 有可能促进出血)

咨询事项

1. 下列人群请在使用前向医师、药剂师或注册经销商咨询

- (1) 正在接受医师治疗的人
- (2) 曾因药物等引起过敏症状的人
- (3) 严重湿润或糜烂的人

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹、发红、发痒、肿胀

3. 使用5~6天症状仍不好转时, 请中止使用, 并持说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询

功能、效果

干皮病, 小儿干燥性皮肤, 手指的皲裂, 手脚的干裂和皲裂, 肘、膝盖、脚后跟、脚踝的角化症, 冻伤(溃烂除外), 碰伤、扭伤后的肿胀、肌肉痛、关节痛, 受伤、烫伤后皮肤的肉芽组织增生、皮肤皱缩(面部除外)

●作为治疗干燥皮肤的药物, 也可用于面部

用法、用量

每天1至数次, 适量涂于患处, 或者撒在涂抹在绷带等上, 贴在患处。

〈与用法、用量有关的注意事项〉

- (1) 使用后将盖子盖紧
- (2) 幼儿使用时, 请在成人的监护下使用
- (3) 请注意防止进入眼内

万一进入眼内时，请立即用冷水或温水清洗

另外，在症状严重时，请接受眼科医师治疗

(4) 本品请仅用于外用

#### 成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
类肝素	0.3g	修复和完善层次结构，滋润角质，增加柔软性
甘草酸二钾	0.5g	抑制皮肤炎症
尿囊素	0.2g	促进皲裂、干裂的皮肤组织的修复

作为添加剂:含有甘油、双丙二醇、1,3 丁二醇、聚氧乙烯氢化蓖麻油、橄榄油、深海鲛鱼油、dl-吡咯烷酮羧酸钠、安息香酸、氢化大豆磷脂、黄原胶、胆固醇、L-天冬氨酸、甘氨酸、DL-丙氨酸、依地酸纳、棕榈酸、硬脂酸、油酸、山嵛酸、pH 调节剂及其他成分

#### 保管及使用注意事项

- (1) 请避免日光直射，在湿气少、阴凉处保管
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>