

洗眼液 アイボン W

使用注意事項

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 對藥物有過敏反應者
- (3) 有下列症狀者：眼睛劇烈疼痛
- (4) 被診斷為眼球乾燥症候群（乾眼症^{***}）者

^{***}以醫生診斷出病名者為前提

2. 使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子與發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹

功能、效果

清洗眼睛、預防眼部疾病（游泳後、灰塵或汗水進入眼睛等情況）

用法、用量

請每天3~6次，每次採用5mL進行洗眼

<用法與用量的注意事項>

1. 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
2. 請勿在佩戴隱形眼鏡的情況下使用
另外，再次佩戴時，應在洗眼後間隔10~15分鐘左右
3. 洗眼杯請在使用前後用自來水充分清洗乾淨
4. 若藥液混濁，請勿使用
5. 僅限於洗眼使用

成分、含量

100mL 中

成分	含量	作用
甘草酸二鉀	25mg	消炎作用
馬來酸氯苯那敏	3mg	抗組織胺作用
牛磺酸	100mg	促進代謝作用
吡哆醇鹽酸鹽（維生素B ₆ ）	10mg	促進代謝作用
氰鈷胺（維生素B ₁₂ ）	1mg	調節功能改善作用
硫酸鹽軟骨素	10mg	角膜保護作用

添加物：硼酸、硼砂、聚山梨醇酯80、乙二胺四乙基二鈉、丙二醇、1-薄荷醇、d1-樟腦、pH調節劑

保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後裝入盒中，存放在避免陽光直射的涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 洗眼杯請勿與他人共用

使用方法

- 如有佩戴隱形眼鏡，在使用前請務必取下隱形眼鏡
- 請在使用前將眼睛周圍的化妝品和污垢擦拭乾淨
- 洗眼杯請在使用前後用自來水充分清洗乾淨
- 由於保存狀態的影響，有時會在容器口周圍附著粉紅色結晶。出現此情況時請用乾淨的紗布輕輕擦拭乾淨
- 未使用隱形眼鏡者也可以使用

銷售商小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 [http:// www.kobayashi.co.jp](http://www.kobayashi.co.jp)