

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - 胃腸虛弱易腹瀉者
  - 高齡者
  - 有下列症狀者：浮腫
  - 曾接受過下列之診斷者：高血壓、心臟病、腎臟病
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請立即停止服用，並持本產品的包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
消化器官	食慾不振、胃部不適

本產品鮮少會引發下列嚴重症狀。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	在爬樓梯，或稍微過度運動時便會氣喘、呼吸困難；或是有乾咳、發燒等上述症狀突然出現或持續不止
假性醛固酮增多症、肌病	手腳癱軟、麻痺、緊繃、僵硬之外，還會出現無力感、肌肉痠痛，且症狀慢慢增強

- 服用後可能會出現以下症狀，若該症狀持續不止或增強時，請停止服用，並持本產品的包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢：腹瀉
- 若服用約 1 個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並持本產品的包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
- 欲長期連續服用時，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

體力中等程度者的以下症狀：頻尿、排尿疼痛、尿不乾淨、尿濁

## 用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年 齡	單次劑量	1 天服用次數
成人（15 歲以上）	4 錠	3 次
7 歲以上未滿 15 歲	3 錠	
5 歲以上未滿 7 歲	2 錠	
未滿 5 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
  - (2) 本藥劑易受潮，因此每次服用後請確實封緊夾鏈袋
  - (3) 讓幼兒服用時，請於監護人的監督下服用
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

## 成分、含量

每天用量（12 錠）中 含五淋散料萃取物 2.55g

<原生中藥換算量>

茯苓 3.0g、當歸 1.5g、黃芩 1.5g、甘草 1.5g、芍藥 1.0g、梔子 1.0g、地黃 1.5g、  
澤瀉 1.5g、木通 1.5g、滑石 1.5g、車前草 1.5g

添加物：無水矽酸、CMC-Ca、硬脂酸鎂、纖維素

- 由於本產品採用了天然產物（藥材），因此顆粒的顏色會有少許差異

## 保管與使用上的注意事項

- (1) 請確實封緊夾鏈袋，並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <http://www.kobayashi.co.jp>