

喉嚨用殺菌消毒劑 のどぬーるスプレーB

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守, 當前的症狀會惡化, 或者易引發副作用。)

1. 下列人士禁用
 - (1) 對本劑或本劑成分、碘(聚維酮碘)有過敏反應者
 - (2) 患有甲狀腺疾病者
 - (3) 未滿2歲的嬰幼兒
 - (4) 懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (5) 處於哺乳期的婦女
2. 請勿長期連續使用
3. 請勿大量噴塗

諮詢事項

1. 下列人士在使用前, 請向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生或牙科醫生診療者
 - (2) 對藥物過敏反應者
 - (3) 有以下症狀者: 口腔嚴重潰爛
2. 使用後如出現下列症狀, 因可能是副作用, 請立即停止使用, 並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
口部	皸裂、刺痛、燒灼感、刺激感
消化器官	噁心
其他	不適感

本產品鮮少會引發下列嚴重症狀
若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
全身型過敏反應	使用後即刻出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音嘶啞、噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難等現象

3. 若服用5~6天後症狀仍無改善, 請停止服用, 並持本包裝向醫生、牙科醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

喉嚨的殺菌與消毒

用法、用量

請以適當的量每天噴塗患部數次

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請將噴嘴對準喉嚨患部，一邊輕輕吐氣一邊噴塗（若在吸氣的同時使用，可能導致液體進入支氣管和肺部）
- (2) 幼兒使用時需特別注意，在監護人的指導監督下使用。
- (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (4) 僅適用於喉嚨
- (5) 因錯誤使用而飲入大量藥液時，請立即接受醫生的診療

成分、含量

100mL 中

成分	含量	作用
碘	0.5g	喉嚨的殺菌和消毒

添加物：碘化鉀、甘油、丙二醇、D-山梨糖醇、乙醇、1-薄荷醇、香料

<成分和含量相關注意事項>

使用本劑後，可能使含銀的牙科材料（假牙等）變色。

使用方法請參閱攜帶袋

保管與使用相關注意事項

- (1) 請在蓋緊瓶蓋後存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
 - (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
 - (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- 使用後，請務必將噴嘴返回原始位置，並蓋好瓶蓋進行保管。
 - 攜帶出門時，請將其裝入附帶的塑膠袋中
 - 若使用藥物過程中導致衣物染色時，請立即用水清洗
 - 液體無法噴出時，請反覆按下噴頭，直到液體噴出為止
 - 存放場所溫度較低時，可能導致液體難以噴出。此時請用手心等部位使其升溫後再進行使用

<其他注意事項>

- 噴塗時，請慢慢地按下噴頭的頭部。按下速度過快可能導致液體往反方向噴濺，敬請注意
- 用針等物品戳噴嘴的尖端可能導致其斷裂，十分危險，請不要這麼做

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <http://www.kobayashi.co.jp>