

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守, 可能會使目前的症狀惡化, 或容易產生副作用)

1. 正在服用本藥劑的期間, 請勿服用以下醫藥品
其他腹瀉劑(瀉藥)
2. 哺乳中的婦女請勿服用本藥劑, 或者服用本藥劑時請避免哺乳

諮詢事項

1. 下列人士在服用前, 請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - (3) 身體虛弱者(體力衰退者、身體較弱者)
 - (4) 胃腸虛弱易腹瀉者
 - (5) 容易冒汗者
 - (6) 高齡者
 - (7) 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
 - (8) 有下列症狀者: 浮腫、排尿困難
 - (9) 診斷為下列疾病的患者: 高血壓、心臟病、腎臟病、甲狀腺機能障礙
2. 服用後如出現下列症狀, 可能為副作用所致, 請立即停止服用, 並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	想吐或嘔吐、食慾不振、胃部不適、腹部脹、伴隨劇烈腹痛的腹瀉、腹痛
精神神經系統	暈眩
其他	冒汗、心悸、浮腫、頭痛

本產品鮮少會引發下列嚴重症狀。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	在爬樓梯, 或稍微過度運動時便會氣喘、呼吸困難; 或是有乾咳、發燒等上述症狀突然出現或持續不止
假性醛固酮增多症、肌病	手腳癱軟、麻痺、緊繃、僵硬之外, 還會出現無力感、肌肉痠痛, 且症狀慢慢增強
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚和白眼珠變黃)、尿液呈褐色、全身無力、食慾不振等現象

3. 服用後可能會出現以下症狀, 若該症狀持續不止或增強時, 請停止服用, 並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢: 腹瀉、便秘
4. 若服用約1個月左右(因便秘而服用時為1星期左右)症狀仍無改善, 請停止服用, 並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
5. 欲長期連續服用時, 請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

體力充沛，腹部皮下脂肪較多、有便秘傾向者的以下症狀：肥胖症，伴隨高血壓和肥胖的心悸、肩膀痠痛、頭部脹紅、浮腫、便秘，蓄膿症（副鼻腔炎），濕疹、皮膚炎，粉刺（青春痘）

用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	5錠	1天3次
未滿15歲	×	不可服用

<用法與用量的注意事項>

- （1）請嚴格遵守規定的用法與用量
 - （2）本藥劑易受潮，因此每次服用後請確實蓋緊瓶蓋
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時

成分、含量

每天用量(15錠)中

含防風通聖散料乾燥萃取物 5.0g

<從以下藥材萃取>

當歸	1.2g	芍藥	1.2g
川芎	1.2g	梔子	1.2g
連翹	1.2g	薄荷	1.2g
生薑	0.3g	荊芥	1.2g
防風	1.2g	麻黃	1.2g
大黃	1.5g	硫酸鈉+水鹽	1.5g
白朮	2.0g	桔梗	2.0g
黃芩	2.0g	甘草	2.0g
石膏	2.0g	滑石	3.0g

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、CMC-Ca、硬脂酸鎂、玉米澱粉

●由於本產品採用了天然產物（藥材），因此顆粒的顏色會有少許差異

保管與使用相關注意事項

- （1）請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- （2）請存放在幼兒拿不到的地方
- （3）請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- （4）請勿用潮濕手拿取本藥劑
- （5）瓶中的充填物是用來防止藥劑在運送時受損的，開封時請丟掉

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <http://www.kobayashi.co.jp>