

外皮用藥 **さいき a**

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，並易引發副作用)

下列人士請勿使用

- (1) 患有出血性血液疾病（血友病、血小板減少症、紫斑病等）者
- (2) 儘管出血甚少仍可能產生嚴重後果者（因血液凝固抑制作用而有增進出血的可能）

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生診療者
- (2) 有藥物過敏史者
- (3) 皮膚過於潮濕或潰爛嚴重者

2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹

3. 若使用 5~6 日後症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

乾皮症、幼童的乾燥性皮膚、手指龜裂、手腳皮膚裂開及龜裂、發生於手肘、膝蓋、腳後跟或腳踝上的角化症、凍傷（潰爛狀態除外）、瘀傷、扭傷後的腫脹、肌肉痛、關節疼痛、受傷或燒傷的疤痕所生成之硬塊、突起（臉部除外）

- 要用來治療乾燥肌膚時，也可使用於臉部

用法、用量

每天使用 1 至數次，可直接塗抹在患部，或是先塗在紗布後黏貼於患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 每次使用完請確實蓋緊瓶蓋
- (2) 幼兒使用時，需在監護人的指導監督下使用
- (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗並立即接受眼科醫生診療
- (4) 本產品僅供外用

**成分、含量**

100g 中

成分	含量	作用
類肝素	0.3g	修復、整頓層狀構造，並賦予角質潤澤和柔軟性
甘草酸二鉀	0.5g	抑制肌膚的發炎
尿囊素	0.2g	有助修復粗糙、裂開的皮膚組織

添加物：甘油、二丙烯甘醇、1,3 丙二醇、蓖麻油聚氧乙烯醚、橄欖油、角鯊烷、d1-咯烷酮羧酸鈉、苯甲酸、氫化大豆卵磷脂、黃原膠、膽固醇、L-天門冬胺酸、甘胺酸、DL-丙胺酸、乙二胺四乙基二鈉、棕櫚酸、硬脂酸、油酸、山嶮酸、酸度調節劑、其他 1 項成分

**保管與使用相關注意事項**

- (1) 請務必存放在避免陽光直射的涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <http://www.kobayashi.co.jp>