

足癬、白癬用藥 タムチンキパウダースプレー Z

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，並易引發副作用)

1. 以下人士請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑內的成分而引起過敏症狀者

2. 請勿用於以下部位

(1) 眼睛或眼睛的周圍、臉部、黏膜、(例如口腔、鼻腔、陰道等)、陰囊、外陰部等部位

(2) 濕疹

(3) 潮濕、潰爛、龜裂或外傷嚴重的患部

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

(1) 正接受診療者

(2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女

(3) 幼童

(4) 有藥物過敏史者

(5) 患部範圍廣泛者

(6) 患部已化膿者

(7) 不確定罹患的是「濕疹」還是「足癬、股癬、錢癬」者(陰囊有發癢、潰爛等症狀時，大多為濕疹等其他的原因所引起)

(8) 有末梢血液循環障礙或認為患有此疾病者

2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、發炎、腫脹、刺激感、落屑、潰爛、起水疱、龜裂

3. 若使用 2 周左右後症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

足癬、股癬、錢癬

用法、用量

1 天 1 次以適量噴塗於患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 患部上或是其周圍有污垢時請勿使用
 - (2) 注意不要噴入眼睛。萬一噴入眼睛時，請立即用水或溫水清洗，並接受眼科醫生的診療
 - (3) 幼兒使用時，需在監護人的指導監督下使用
 - (4) 本產品僅供外用
 - (5) **使用前請充分搖晃瓶身**
 - (6) 請於靠近患部約 **3cm** 的距離內進行噴塗
 - (7) **請勿於同一處連續噴塗 1 秒以上，可能會有凍傷的危險**
- 請務必遵守用法及用量
 - 請注意並避免直接吸入

成分、含量

100g 中

成分	含量
鹽酸布蝶啶	200mg
利多卡因	500mg
甘草酸	200mg
1-薄荷醇	200mg
苯扎氯銨	10mg

添加物：肉豆蔻酸異丙脂、乙醇、滑石、二氧化鈦、玉米澱粉、BHT、DME

保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的涼爽之處（陰涼處）
 - (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
 - (3) 請不要靠近火源
- 請勿以沾有本藥劑的手觸碰眼睛或黏膜
 - 由於本藥劑可能會軟化成樹脂、融化塗料，故盡量別讓本藥劑接觸家具和地板等

火源與高溫的相關注意事項

- 丟棄前，請先至沒有火源的戶外按壓噴頭、抽出內部的氣體，直到不再發出噴射音後再丟棄。
- 高壓氣體：DME
嚴禁火源 第一石油類 危險等級 II
乙醇含有物 14g

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <http://www.kobayashi.co.jp>