

中药制剂 **ボーコレン**

使用注意事項

咨询事项

1. 以下人士请在服用前向医生、药剂师或者注册销售商咨询

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 妊娠或有妊娠可能的妇女
- (3) 胃肠虚弱易腹泻的人
- (4) 老年人
- (5) 有下列症状的人：浮肿
- (6) 诊断患有以下疾病的人：高血压、心脏病、肾脏病

2. 服用后如出现下列症状，可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
消化器官	食欲不振、胃部不适

本产品偶尔会引发下列严重症状。此时请立即接受医生的治疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯，或稍微过度运动时便会气喘、呼吸困难，到干咳、发热等症，上述症状突然出现或持续不止
假性醛固酮增多症、肌肉病变	除手脚酸软、麻痹、紧绷、僵硬之外，还会出现无力感、肌肉疼痛，且症状慢慢加重

3. 服用后可能会出现以下症状，若该症状持续不止或加重时，请停止服用，并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询：腹泻
4. 服用一个月左右后症状仍无好转，请停止服用，并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询
5. 长期连续服用时，请向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

体力中等程度的以下症状：尿频、排尿疼痛、残尿感、尿浊

用法、用量

请按照以下剂量，餐前或餐间用水或温水服用

年 龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15 岁以上）	4 片	3 次
7 岁以上未满 15 岁	3 片	
5 岁以上未满 7 岁	2 片	
未满 5 岁	× 不可服用	

<用法与用量的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 本药剂易受潮，因此每次服用后请妥善封紧夹链袋
 - (3) 儿童服药时，请于监护人的监督下服用
- 餐间是指“两餐之间”，指餐后约 2~3 小时

成分、含量

每日用量（12 片）中 含五淋散提取物 2.55g

<中草药换算量>

茯苓 3.0g、当归 1.5g、黄芩 1.5g、甘草 1.5g、芍药 1.0g、山栀子 1.0g、地黄 1.5g、泽泻 1.5g、木通 1.5g、滑石 1.5g、车前子 1.5g

辅料：无水硅酸、CMC-Ca、硬脂酸镁、纤维素

- 由于本剂采用了天然物（中草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

保管与使用注意事项

- (1) 请妥善封紧夹链袋，并在避光阴凉处保管。
- (2) 请将本品放在儿童不易接触的地方
- (3) 请勿倒入其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用沾水的手拿取本药剂

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>