

中药制剂 **ビスラット ゴールド EX**

使用注意事項

禁止事項 (若不遵守, 可能会造成目前症状恶化, 或容易产生副作用)

1. 正在服用本药剂的期间, 请勿服用以下药品
其他腹泻剂(泻药)
2. 哺乳期妇女请勿服用本药剂, 或者服用本药剂时要停止哺乳

咨询事项

1. 以下人群请在服用前向医师、药剂师或注册经销商咨询
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 妊娠或有妊娠可能的妇女
 - (3) 身体虚弱的人(体力衰退的人、身体较弱的人)
 - (4) 胃肠虚弱易腹泻的人
 - (5) 曾因药物等引起过皮疹、发红、发痒等症状的人
2. 服用后如出现下列症状, 可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒
消化器官	伴随剧烈腹痛的腹泻、腹痛

本产品偶尔会引发下列严重症状。此时请立即接受医生的治疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯, 或稍微过度运动时便会气喘、呼吸困难, 到干咳、发热等症, 上述症状突然出现或持续不止
肝功能障碍	出现发热、发痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、尿液呈褐色、浑身无力、食欲不振等症

3. 服用后可能会出现以下症状, 若该症状持续不止或加重时, 请停止服用, 并持本说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询: 腹泻
4. 若服用一个月左右后(因习惯性便秘、伴随高血压和肥胖的便秘而服用时为5~6天)症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

体力充沛，侧腹部到胸口处疼痛、有便秘倾向的以下症状：肥胖症、习惯性便秘、伴随高血压和肥胖的肩膀酸痛、头痛、便秘、胃炎、神经症

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或温水送服

年 龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15 岁以上)	5 片	2 次
未满 15 岁	× 不可服用	

<用法与用量的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 本药剂易受潮，因此每次服用后请妥善盖紧瓶盖
- 餐间是指“两餐之间”，指餐后约 2~3 小时

成分、含量

每日用量（10 片）中 含大柴胡汤提取物（3 / 5 量）2.4g

<以下中草药提取>

柴胡	3.6g	半夏	2.4g
生姜	0.6g	黄芩	1.8g
芍药	1.8g	大枣	1.8g
枳实	1.2g	大黄	0.6g

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、硬脂酸镁、玉米淀粉

- 由于本产品采用了天然物（中草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

保管与使用注意事项

- (1) 请盖紧瓶盖，并在避光阴凉处保管
- (2) 请将本品放在儿童不易接触的地方
- (3) 请勿倒入其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用沾水的手拿取本药剂
- (5) 瓶中的充填物用于防止药剂在运送时受损，开封时请丢弃

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>