

口腔、咽喉用药 ハレナーズ

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或引起不良反应)

- 服用本药物期间, 请勿服用下列的任何一种药物。
 - 含有甘草或其主成分甘草甜素的口服药
(可能会发生浮肿, 血压升高以及肌病(Myopathy)等)
 - 含有氨甲环酸的口服药
(鼻炎口服药、感冒药、解热镇痛药, 镇咳祛痰药等)
- 请勿长期连续使用

咨询事项

- 下列人群请在服用前向医师、药剂师或注册经销商咨询
 - 正在接受医生或牙科医生治疗的人
 - 妊娠或有妊娠可能的妇女
 - 老年人
 - 有药物过敏史的人
 - 有下列症状的人: 浮肿
 - 被诊断为下列疾病的人
有高血压、心脏病、肾病、血栓的人(脑血栓、心肌梗塞、血栓静脉炎等), 可能发生血栓症的人
- 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、发痒
消化器官	恶心、呕吐、胃灼热、食欲不振或促进食欲、胃部不适感、胃胀
精神神经系统	头晕
其他	频尿

本品偶尔会引发以下严重症状

此时请立即接受医生的治疗

症状的名称	症状
假性醛固酮增多症、Myopathy	出现四肢的倦怠、麻木、绷紧感和僵硬以及四肢无力感, 肌肉疼痛并且这些症状会逐渐增强

- 服用后可能会出现下列症状, 因此如发现这些症状持续或增强, 请停止服用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询
腹泻
- 服用5~6天后, 症状仍无好转, 请停止服用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

扁桃体炎（喉咙肿胀、喉咙痛）、咽炎、口腔炎

用法、用量

请在早、中、晚服用下述用量

年 龄	1 次量	每天服用次数
成人(15 岁以上)	1 包	3 次
7 岁以上但未满 15 岁	1/2 包	
为未满 7 岁	× 请勿服用	

<用法与用量的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 幼儿服用时，请在成人的监护下服用
- 不用水也可以服用

成分、含量

每天量(3 包: 3.9g) 中

氨甲环酸..... 750mg

甘草提取物..... 198mg(原生中草药换算量 990mg)

盐酸吡哆醇(维生素 B₆)..... 50mg

核黄素(维生素 B₂)..... 12mg

L-抗坏血酸钠(维生素 C 钠)..... 500mg

添加剂: 赤藓糖醇、预胶化淀粉、二氧化硅、滑石、焦糖、无水硅酸、1-薄荷醇、香料

<成分与含量的注意事项>

- (1) 由于本药物中配伍有核黄素(维生素 B₂)，尿液可能会变成黄色
- (2) 服用本药物会对尿以及粪便的检查值产生影响

接受医生的检查时，请告知医生正在服用含有维生素 C 的制剂

保管及使用注意事项

- (1) 请保管避免阳光直射，低湿度，阴凉的地方
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中(可能造成误用或者变质)
- (4) 将 1 包分成几次服用时，剩余药物折叠袋口后保管
另外，保管的剩余药物请在当日内服用或作废

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>