

皮肤软化药 クロキュア b

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或引起不良反应)

请勿对以下部位使用

- (1) 眼部周围、粘膜等部位
- (2) 刮伤等伤口、裂缝(龟裂)部位
- (3) 像疮痂一般被剥离的皮肤部位
- (4) 炎症部位(疮疡、红肿部位)

咨询事项

1. 下列人群请在使用前向医师、药剂师或注册经销商咨询
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 有药物过敏史的人
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒、刺激感(疼痛、发热、麻痹感)、皮肤像疮痂一般被剥离的状态

3. 使用2周左右后症状仍无好转, 请停止使用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

肘部、膝盖、脚后跟、脚踝的角化症、手指粗糙、鲨皮斑、老人的干皮症

用法、用量

1 日数次适量涂于患部。

<用法与用量的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量。
- (2) 请注意不要溅入眼睛。万一溅入眼睛时, 请立即用水或温水清洗。此外, 症状较严重时, 请接受眼科医生的诊疗。
- (3) 幼儿使用时, 请在成人的监护下使用。
- (4) 本品仅供外用。
- (5) 本品并非化妆品, 因此请仅对功能和效果项中规定的患部使用, 不要作为基础化妆品等对面部使用。

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
尿素	20.0g	除去变厚的角质，还您光滑皮肤
生育酚乙酸酯	0.5g	促进血液循环，增强皮肤新陈代谢
甘草酸单铵	0.5g	抑制皮肤炎症

添加剂：聚山梨醇酯 60、聚氧乙烯氢化蓖麻油、甘油、丙二醇、对羟基苯甲酸酯、石蜡、液体石蜡、硬脂醇、鲸蜡醇、肉豆蔻酸异丙酯、羧乙烯基聚合物、角鲨烷、三乙醇胺

保管及使用注意事项

- (1) 请不要用沾有本剂的手触碰眼睛和粘膜。
- (2) 请在密闭瓶盖后保管在避免阳光直射的阴凉地方。
- (3) 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- (4) 请勿换装到其他容器中。（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>