

口腔咽喉药 のどぬーるスプレーキッズC

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或引起不良反应)

1. 下列禁用
  - (1) 对本品或本品成分, 聚维酮碘(碘)有过敏史的人
  - (2) 患有甲状腺疾病的人
  - (3) 不满2岁的婴幼儿
2. 请不要长期连续使用
3. 请不要大量喷射

咨询事项

1. 下列人群请在使用前向医师、牙科医师、药剂师或注册经销商咨询
  - (1) 正在接受医师或牙科医师治疗的人
  - (2) 孕妇或可能怀孕的人
  - (3) 处于哺乳期的人
  - (4) 有药物过敏史的人
  - (5) 有以下症状的人: 口腔内严重溃烂
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持包装向医师、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
口腔	干裂、刺痛、灼热感、刺激感
消化道	恶心
其他	不适感

偶尔会出现下列严重症状  
此时请立即接受医师的治疗

症状名称	症状
休克(过敏性反应)	使用后即刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、喷嚏、喉咙瘙痒、呼吸困难、心悸、意识混浊等

3. 使用5~6天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持说明书向医师、牙科医师、药剂师或注册销售商咨询

## 功能、效果

咽喉炎引起的喉咙干燥、喉痛、喉肿、喉咙不适感、声音嘶哑

## 用法、用量

请每天数次，适量喷于喉咙的粘膜处

〈用法与用量有关的注意事项〉

- (1) 请将喷嘴对准喉咙患部，一边轻轻呼气一边喷射（若在吸气的时候使用，可能会导致液体进入支气管及肺腔）
- (2) 幼儿使用时需要特别注意，请在成人的监护下使用
- (3) 请注意不要溅入眼睛  
万一溅入眼睛时，请立即用水或温水清洗。症状严重时，请接受眼科医师治疗
- (4) 本品仅用于咽喉
- (5) 因错误操作饮入大量药液时，请立即接受医师治疗

## 成分、含量

100mL 中

聚维酮碘———0.45g

添加剂：碘化钾、甘油、乙醇、柠檬酸、柠檬酸钠、薄荷醇、香料

〈成分和含量相关注意事项〉

使用本品后，可能使含有牙科银合金材料（假牙等）变色。

## 保管及使用注意事项

- (1) 请避免日光直射，在潮气小、阴凉处密封盖子后直立保管
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）。
- (4) 请不要靠近火源（本品为含乙醇物质）
  - 使用后，请务必盖紧盖子，将喷嘴恢复原位后保管
  - 携带出门时，请将其装入附带的塑料袋内
  - 使用过程中，喷溅出的药液会使衣物变色，请立即用水清洗。
  - 液体无法喷出时，请反复按泵头，直至液体喷出为止。
  - 保管场所温度较低时，可能导致液体难以喷出。此时请用手心等部位使其升温后在进行使用。

其他注意事项

- 喷射时，请缓慢按泵的头部。按下速度过快可能导致液体飞溅，请注意
- 用针等物品戳喷嘴的尖端可能导致其折断，十分危险，请绝对不要这样做

## 严禁烟火

第二石油类 危险等级III

含乙醇物质 水溶性

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>