

液体创可贴 サカムケア a

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或引起不良反应)

请勿对以下部位使用

- (1) 处于糜烂、化脓状态的患部
- (2) 眼睛和眼睛周围、粘膜等部位
- (3) 大伤口、深伤口、湿疹或出血的患部

咨询事项

- 1. 下列人群请在使用前向医师、药剂师或注册经销商咨询
 - (1) 正在接受医生治疗的人
 - (2) 有药物过敏史的人
- 2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒、斑疹

- 3. 使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

倒刺、擦伤、裂口、皮肤皴裂、割伤

用法、用量

请清洁患部, 适量涂布于伤口, 并静待其干燥。

〈用法与用量的注意事项〉

- (1) 在患部及其周围有污物时请勿使用。
- (2) 患处因汗或水濡湿时, 充分擦干后再使用。
- (3) 请注意不要溅入眼睛。万一溅入眼睛时, 请立即用水或温水清洗并立即接受眼科医生治疗。
- (4) 幼儿使用时, 需在成人的监护下使用。
- (5) 本品仅供外用, 禁止内服。
- (6) 涂布伤口时, 会有瞬间的刺痛感, 刺痛感在干燥后自动消失。
- (7) 使用后请勿用水冲洗刷子。(药剂接触水后可能会凝固成凝胶状)

成分、含量

100g 中

成分	含量	作用
硝酸纤维素	12g	形成保护膜覆盖患部

添加剂：棕榈酸异丙酯、蓖麻油、d1-樟脑、生育酚乙酸酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯甲醇、异丙醇

保管及使用注意事项

- (1) 请务必在密闭瓶盖后保管在避免阳光直射的阴凉地方
(不拧紧盖子会导致药剂凝固，无法使用)
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。(可能造成误用或者变质)
- (4) 请勿靠近火源(本品含异丙醇)
- (5) 请不要在有误饮(吮吸手指等)可能的情况下使用
 - 想要尽快剥离本品时，请在涂布部位复涂一层，并在其干燥前擦拭干净
 - 请注意不要将本品附着于衣物和家具等物品上，会变得难以除去
 - 根据成分的不同，刷子和刷柄的颜色可能会出现变化，这并非质量问题

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>