

痤疮治疗药 **セナキュア**

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或引起不良反应)

不要用于下列部位

眼睛及眼睛周围

咨询事项

1. 下列人群请在使用前向医师、药剂师或注册经销商咨询

- (1) 正在接受医师治疗的人
- (2) 有药物过敏史的人
- (3) 患处范围较大的人
- (4) 湿润及溃烂严重的人
- (5) 伤口较深及严重烫伤的人
- (6) 有硬结(硬疙瘩)的重症患者

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持包装向医师、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒

3. 使用两周左右后症状仍不好转, 请停止使用, 并持说明书向医师、药剂师或注册销售商咨询

4. 其他

- (1) 本品对伤口会产生刺痛、灼痛等一过性的刺激。感觉异常时, 请停止使用
- (2) 使用后引起皮肤干燥或发红, 应中止使用并应当间隔一段时间后再次使用。

功能、效果

痤疮

用法、用量

请每天 2 次(早、晚) 适量涂于患处

<用法与用量的相关注意事项>

- (1) 使用前请在手臂内侧等处少量涂抹，放置一夜，若次日早晨涂抹部位出现过敏症状（发疹、发红、瘙痒等）时，请慎用。
- (2) 请严格遵守规定的用法、用量
- (3) 幼儿使用时，请在成人的监护下使用
- (4) 请注意不要溅入眼睛
万一溅入眼睛时，请立即用水或温水清洗。症状严重时，请接受眼科医师治疗
- (5) 本品仅供外用

成分、含量

100g 中

水杨酸……………0.5g

乙醇……………22.84g

尿囊素……………0.2g

添加剂：1,3-丁二醇、甘油、对羟基苯甲酸酯、依地酸钠、pH 调节剂

保管及使用注意事项

- (1) 请避免日光直射，在湿气少、阴凉处盖紧盖子保管
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
- (3) 请不要改换到其他容器中（否则有可能导致误用或变质）
- 避免沾染到衣服、被褥、家具、地板等上（根据材质的不同，可能会不易清除或变色、变质）
- 残余量较少时，倒立（倒置）使用可能会不易喷雾。如正立空喷后可以喷雾

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>