

足癬、顽癬用药 タムチンキパウダースプレー Z

使用注意事项

禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或引起不良反应)

1. 下列人群不要使用

曾因本剂或本剂的成分而引起过敏的人

2. 不要用于以下部位

(1) 眼睛及眼睛周围、面部、粘膜(例如口腔、鼻腔、阴道等)、阴囊、外阴部等

(2) 湿疹

(3) 湿润、溃烂、龟裂及外伤严重的患处

咨询事项

1. 下列人群请在使用前向医师、药剂师或注册经销商咨询

(1) 正在接受医师治疗的人

(2) 孕妇或可能怀孕的人

(3) 婴幼儿

(4) 曾因药物等引起过敏症状的人

(5) 患处范围较大的人

(6) 患处化脓的人

(7) “湿疹”或“足癬、腹股沟癬、体部白癬”(发痒、溃烂)(阴囊有发痒、溃烂等症状时, 是由于湿疹等其他原因引起的情况很多)

(8) 患有或可能患有末梢血液循环障碍的人

2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

有关部位	症状
皮肤	皮疹、发红、发痒、肿胀、刺激感、落屑、溃烂、水泡、龟裂

3. 使用两周症状仍不好转时, 请中止使用, 并持包装向医师、药剂师或注册经销商咨询

效能、效果

足癬、腹股沟癬、体部白癬

用法、用量

请每天1次适量喷于患处

〈与用法、用量有关的注意事项〉

(1) 请不要在未对患处及周围进行清洁的情况下使用

(2) 请注意防止进入眼内

万一进入眼内时，请立即用冷水或温水清洗，并立即接受眼科医师治疗

(3) 幼儿使用时，请在成人的监护下使用

(4) 本品请仅用于外用

(5) **使用前请摇晃均匀**

(6) 请在距患处约3cm的距离进行喷射

(7) **因为有可能冻伤，所以请不要对同一部位连续喷射1秒以上**

● 请遵守用法、用量

● 请注意防止直接吸入

成分、含量

100g 中

成分	含量
盐酸丁萘芬	200mg
利多卡因	500mg
甘草次酸	200mg
薄荷醇	200mg
苯扎氯铵	10mg

作为添加剂，含有肉豆蔻酸异丙酯、酒精、滑石粉、氧化钛、玉米淀粉、BHT、DME

保管及使用注意事项

(1) 请避免日光直射，在湿气少、阴凉处盖紧盖子保管

(2) 请将本品放在儿童不能接触的地方。

(3) 请不要接近火源

● 请不要用沾有本剂的手触摸眼睛或粘膜

● 由于本剂可能使合成树脂等发生软化或将涂料溶化，故请不要沾到家具或地板等上

注意避开火源和高温

● 废弃时请在没有火源的室外按下按钮排气，直至喷射声消失后再废弃

高压气体：DME

严禁烟火 第一石油类 危险等级 II

含酒精物质 14g

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>