

中药制剂 チクナイン b

使用注意事項

咨询事项

1. 以下人群请在服用前向医师、药剂师或注册经销商咨询

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 妊娠或有妊娠可能的妇女
- (3) 身体虚弱的人（体力衰退的人、身体较弱的人）
- (4) 胃肠虚弱且身体虚寒的人

2. 服用后如出现下列症状，可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

相关部位	症状
消化器官	食欲不振、胃部不适

本产品偶尔会引发以下严重症状。此时请立即接受医生的治疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯，或稍微过度运动时便会气喘、呼吸困难，到干咳、发热等症状，上述症状突然出现或持续不止
肝功能障碍	出现发热、发痒、皮疹、黄疸（皮肤和白眼珠变黄）、尿液呈褐色、浑身无力、食欲不振等症状
肠系膜静脉硬化性大肠炎	因长期服用而反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀等症状

3. 若服用一个月左右后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

体力中等程度以上，浓稠鼻涕、偶尔伴随燥热感的以下症状：鼻塞、慢性鼻炎、蓄脓症（鼻窦炎）

用法、用量

请按照以下剂量，于早晚、餐前或餐间以水或温水送服

年 龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15 岁以上)	4 片	2 次
7 岁以上未满 15 岁	3 片	
5 岁以上未满 7 岁	2 片	
未满 5 岁	× 不可服用	

<用法与用量的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 儿童服药时，请在监护人的监督下服用
- 餐间是指“两餐之间”，指餐后约 2~3 小时

成分、含量

每日用量(8 片)中

含辛夷清肺汤提取物 2.0g

<以下中草药提取>

辛夷	1.5g	知母	1.5g	百合	1.5g
黄芩	1.5g	山栀子	0.75g	麦门冬	3.0g
石膏	3.0g	生麻	0.75g	枇杷叶	0.5g

辅料：无水硅酸，硅酸铝、CMC-Ca，硬脂酸镁，玉米淀粉

●由于本剂采用了天然物（中草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

保管与使用注意事项

- (1) 请盖紧瓶盖并保管在避免阳光直射的阴凉地方
- (2) 请将本品放在儿童不能接触的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手拿取本药剂
- (5) 瓶中的充填物用于防止药剂在运送时受损，开封时请丢弃

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>