

外皮用藥 アットノン EX

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守, 可能導致現有症狀惡化, 並易引發副作用)

1. 下列人士請勿使用
 - (1) 患有出血性血液疾病(血友病、血小板減少症、紫斑病等)者
 - (2) 儘管出血甚少仍可能產生嚴重後果者(因血液凝固抑制作用而有增進出血的可能)
2. 請勿用於以下部位 眼睛及眼部周圍、黏膜等部位(例如口腔、鼻腔、陰道等)

諮詢事項

1. 下列人士在使用前, 請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 對藥物過敏反應者
 - (3) 皮膚潮濕和潰爛嚴重者
2. 使用後如出現下列症狀, 因可能為副作用, 請立即停止使用, 並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

| 相關部位 | 症狀 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 長疹子與發紅、發癢、腫脹 |

3. 如使用 5~6 天後, 症狀仍無改善, 請停止使用, 並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

傷口、燒傷後的皮膚硬塊、突起(臉部除外)、手肘、膝蓋、腳後跟、腳踝的角化症、手指的乾燥、手腳皮膚裂開及龜裂、乾皮症、幼兒的乾燥性皮膚、凍傷(潰爛除外)、擦傷與扭傷後的腫脹、肌肉痛、關節痛

用法、用量

請每天使用 1~數次, 在患部上適量塗抹, 或塗在紗布上後貼上

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請每次使用後, 蓋緊瓶蓋
- (2) 幼兒使用時, 請在監護人的指導監督下使用
- (3) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時, 請立即用水或溫水清洗。此外, 症狀較嚴重時, 請接受眼科醫生的診療
- (4) 本品僅供外用

成分、含量

100g 中

| 成分 | 含量 | 作用 |
|-------|------|----------------------------|
| 類肝素 | 0.3g | 促進皮膚新陳代謝作用、促進血液循環作用、水分保持作用 |
| 尿囊素 | 0.2g | 協助受損皮膚組織的修復 |
| 甘草酸二鉀 | 1g | 抑制肌膚的發炎 |

添加物：羥丙甲纖維素、卡波莫、丙二醇、異丙醇、三異丙醇胺、香料

保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>