

### 使用注意事項

**禁止事項** (若不遵守, 可能會使目前的症狀惡化, 或容易產生副作用)

1. 正在服用本藥劑的期間, 請勿服用以下醫藥品  
其他腹瀉劑 (瀉藥)
2. 哺乳中的婦女請勿服用本藥劑, 或者服用本藥劑時請避免哺乳

### 諮詢事項

1. 下列人士在服用前, 請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生治療者
  - (2) 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - (3) 身體虛弱者 (體力衰退者、身體較弱者)
  - (4) 胃腸虛弱易腹瀉者
  - (5) 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
2. 服用後如出現下列症狀, 可能為副作用所致, 請立即停止服用, 並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
消化器官	伴隨劇烈腹痛的腹瀉、腹痛

本產品鮮少會引發下列嚴重症狀。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	在爬樓梯, 或稍微過度運動時便會氣喘、呼吸困難; 或是有乾咳、發燒等上述症狀突然出現或持續不止
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸 (皮膚和白眼珠變黃)、尿液呈褐色、全身無力、食欲不振等現象

3. 服用後可能會出現以下症狀, 若該症狀持續不止或增強時, 請停止服用, 並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢: 腹瀉
4. 若服用約一個月左右 (因習慣性便秘、伴隨高血壓和肥胖的便秘而服用時為 5~6 天) 症狀仍無改善, 請停止服用, 並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

體力充沛，從側腹部到胸口一帶感到疼痛、有便秘傾向者的以下症狀：肥胖症、習慣性便秘、伴隨高血壓和肥胖的肩膀痠痛、頭痛、便秘、胃炎、精神官能症

## 用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	5錠	1天2次
未滿15歲	×	不可服用

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
  - (2) 本藥劑易受潮，因此每次服用後請確實蓋緊瓶蓋
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時

## 成分、含量

每天用量（10錠）中 含大柴胡湯萃取物（3/5量）2.4g

<從以下藥材萃取>

柴胡	3.6g	半夏	2.4g
生薑	0.6g	黃芩	1.8g
芍藥	1.8g	大棗	1.8g
枳實	1.2g	大黃	0.6g

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、CMC-Ca、硬脂酸鎂、玉米澱粉

- 由於本產品採用了天然產物（藥材），因此顆粒的顏色會有少許差異

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕手拿取本藥劑
- (5) 瓶中的充填物用於防止藥劑在運送時受損，開封時請丟掉

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <http://www.kobayashi.co.jp>