

## 第 2 類醫藥品

# 中藥製劑 清肺湯顆粒 **ダスモック**

### 使用注意事項

#### 諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
  - 胃腸虛弱者
  - 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
- 服用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢

本產品鮮少會引發下列嚴重症狀  
若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	在爬樓梯，或稍微過度運動時便會氣喘呼呼、呼吸困難；或是有乾咳、發燒等上述症狀突然出現或持續不止
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸（皮膚和白眼珠變黃）、尿液呈褐色、全身無力、食欲不振等現象

- 若服用約一個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

#### 功能、效果

體力中等程度，咳嗽不止、痰多且難以咳盡等以下症狀：咳嗽時帶有大量的痰、支氣管炎

#### 用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	1 包	3 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

## 成分、含量

每天用量(3包: 6.0g)中 含清肺湯萃取物 3.2g

<原生中藥換算量>

黃芩	1.0g	桔梗	1.0g	桑白皮	1.0g
杏仁	1.0g	山梔子	1.0g	天門冬	1.0g
川貝	1.0g	陳皮	1.0g	大棗	1.0g
竹筴	1.0g	茯苓	1.5g	當歸	1.5g
麥門冬	1.5g	五味子	0.25g	生薑	0.25g
甘草	0.5g	(添加劑: 含糊精)			

添加物: 硬脂酸鎂, 二氧化矽, 1-薄荷醇, 丙二醇, 乳糖

●由於本產品採用了天然產物(藥材), 因此顆粒的顏色會有少許差異

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中(可能造成誤用或者變質)

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 [http:// www.kobayashi. co. jp](http://www.kobayashi.co.jp)