

第3類醫藥品

口腔咽喉藥 のどぬーるスプレーキッズC

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守, 可能導致現有症狀惡化, 或易引發副作用)

1. 以下人士請避免使用

(1) 曾因本劑或本劑中含有的聚維酮碘(碘)而引起過敏反應者 (2) 有甲狀腺疾病的患者 (3) 2歲以下的幼兒

2. 請勿長期連續使用

3. 請勿大量噴

諮詢事項

1. 下列人士在使用前, 請向醫生、牙醫、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生或牙醫治療者
- (2) 孕婦或可能已經懷孕者
- (3) 餵母乳中的人
- (4) 曾因藥劑等物品引起過敏症狀者
- (5) 有以下症狀者: 口內嚴重潰瘍

2. 使用後如出現下列症狀, 有可能是副作用, 請立刻停止使用, 並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢
口	乾裂、刺痛、灼熱感、刺激感
消化器官	噁心
其他	不適

此外, 若發生以下嚴重症狀, 請立刻就醫

症狀名稱	症狀
休克(全身型過敏性反應)	使用後隨即出現皮膚搔癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴涕、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識不清等症狀

3. 若使用 5~6 天後症狀仍無改善, 請停止使用, 並持本包裝向醫生、牙醫、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

因喉嚨發炎引起的喉嚨乾裂、喉嚨痛、喉嚨腫脹、喉嚨不適、聲音沙啞

用法、用量

請每天數次適量噴於喉嚨的黏膜上

<用法、用量相關注意事項>

- (1) 將噴嘴對準喉嚨患部，輕輕呼氣並按下噴頭（邊吸氣邊使用恐會造成液體流進支氣管和肺部等狀況）
- (2) 孩童使用時應特別注意，請在監護人的指導下使用
- (3) 注意避免跑進眼睛，若不慎跑進眼睛，請立刻用清水或溫水清洗。若症狀嚴重，請立刻至眼科就醫
- (4) 本品僅限用於喉嚨
- (5) 若不慎吞入大量藥液，請立刻就醫

成分、含量

100mL 中

聚維酮碘———0.45g

內含作為添加物的碘化鉀、甘油、乙醇、檸檬酸、檸檬酸鈉、1-薄荷醇、香料

<成分、含量相關注意事項>

使用本品可能導致含銀的牙科材料（假牙等）變色

保管及使用注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並直立保存於避免陽光直射的乾燥、陰涼處
 - (2) 請保管在孩童拿不到的地方
 - (3) 請勿換裝到其他容器(可能造成誤用、品質產生變化)
 - (4) 請避免接近火源（含有乙醇）
- 使用後請蓋緊瓶蓋、將噴嘴移回原位並妥善保管
 - 攜帶時請放進附贈的塑膠袋內
 - 使用時若藥液不慎噴濺到衣物上而染色時，請立刻以清水清洗
 - 若藥液未噴出，請多按幾次讓藥液噴出
 - 保管在低溫環境時，可能造成藥液不易噴出。此時，請以手掌溫度加溫後再使用

其他注意事項

- 噴藥液時，請慢慢按壓噴頭。若按壓速度太快，可能造成藥液噴濺而飛散
- 用針等尖銳物插入噴嘴的前端而折斷的話會引發極大危險，請務必避免危險動作。

嚴禁火源

第二石油類 危險等級III
含乙醇物質 水溶性

銷售商 小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 <http://www.kobayashi.co.jp>