

## 液體絆創膏 サカムケア a

### 使用注意事項

#### 禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，並易引發副作用)

請勿用於以下部位

- (1) 潰爛、化膿狀態的患部
- (2) 眼睛或是眼睛周圍、黏膜等部位
- (3) 有大傷口、深傷口、濕疹或正在出血的患部

#### 諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生診療者
  - (2) 有藥物過敏史者
2. 使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、接觸性皮炎

3. 若使用 5~6 天後症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

#### 功能、效果

倒刺、擦傷、龜裂、皮膚皸裂、切傷

#### 用法、用量

請清潔患部，僅對傷口塗抹適量本產品，並靜待其乾燥

<用法與用量的注意事項>

- (1) 患部上或是其周圍有污垢時請勿使用
- (2) 患部被汗和水浸濕時，請將水擦乾之後再使用
- (3) 請注意不要讓它跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗並立即接受眼科醫生診療
- (4) 幼兒使用時，需在監護人的指導監督下使用
- (5) 本品僅供外用，禁止內服
- (6) 塗抹傷口時，會有一瞬的刺痛，刺痛感在乾燥後自動消失
- (7) 使用後請勿用水沖洗刷子（藥劑接觸水後可能會凝固成凝膠狀）

**成分、含量**

100g 中

成分	含量	作用
硝酸纖維素	12g	形成保護膜覆蓋患部

添加物：棕櫚酸異丙酯、蓖麻油、d1-樟腦、生育酚乙酸酯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、苜醇、異丙醇

**保管與使用相關注意事項**

- (1) 請務必將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的涼爽之處  
(不密封會導致藥劑凝固，無法使用)
  - (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
  - (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
  - (4) 請勿靠近火源（本品含異丙醇）
  - (5) 請避免在有誤飲（吮吸手指等）可能的情況下使用
- 想儘快除去本產品時，請在塗抹部位再塗上一層，並在其乾燥前擦拭乾淨
  - 請注意，勿將本產品沾在衣物和傢俱等物品上，可能會造成難以除去
  - 根據成分的不同，刷子和刷柄的顏色可能會出現變化，但並沒有品質上的問題

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <http://www.kobayashi.co.jp>