

## 第 2 類醫藥品

# 中藥製劑 ユリナール b

## 使用注意事項

### 諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
- 服用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

本產品鮮少會引發下列嚴重症狀  
若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	在爬樓梯，或稍微過度運動時便會氣喘、呼吸困難；或是有乾咳、發燒等上述症狀突然出現或持續不止
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸（皮膚和白眼珠變黃）、尿液呈褐色、全身無力、食欲不振等現象

- 若服用約一個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

### 功能、效果

體力中等程度以下，胃腸虛弱、全身倦怠、口乾舌燥、排尿不順者的以下症狀：頻尿、尿不乾淨、排尿疼痛、排尿困難、尿濁、白帶

### 用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15 歲以上）	5 錠	2 次
未滿 15 歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- 請嚴格遵守規定的用法與用量
  - 本藥劑易受潮，因此每次服用後請確實蓋緊瓶蓋
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約 2~3 小時

## 成分、含量

每天用量（10錠）中

含清心蓮子飲萃取物 2238mg

<原生中藥換算量>

蓮子	3.5g	麥門冬	2.1g
茯苓	2.8g	胡蘿蔔	3.5g
車前子	2.1g	黃芩	2.1g
黃耆	2.8g	地骨皮	2.1g
甘草	0.7g		

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、CMC-Ca、纖維素、交聯羧甲基纖維素鈉、硬脂酸鎂、丙二醇、香蘭素、乙基香蘭素、香料

●由於本產品採用了天然產物（藥材），因此顆粒的顏色會有少許差異

## 保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑
- (5) 瓶中的充填物是防止藥劑在運送時破損，開封時請丟掉
- (6) 請勿服用乾燥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <http://www.kobayashi.co.jp>